

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع: تداوم خدمات واکسیناسیون در شرایط پاندمی COVID-19
با سلام و احترام

ایمن سازی کودکان از خدمات بهداشتی اساسی است که کودکان و جامعه را از ابتلا به بیماری و طغیان بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن محافظت می کند. پیشگیری از بروز بیماری و طغیان، قطعا منابع و هزینه های کمتر نسبت به مقابله با طغیان داشته و از مضاعف شدن کار کارکنان بهداشتی در شرایط حجم بالای کار ناشی از پاندمی COVID-19 نیز جلوگیری می کند. با توجه به لزوم تداوم خدمات واکسیناسیون در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت، ضروری است که نکات پیشگیری از انتشار بیماری کروناویروس COVID-19 به شرح ذیل رعایت گردد:

- 1- استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کارکنان بهداشتی حسب پروتکل های وزارت متبوع فراهم باشد.
 - 2- امکان رعایت بهداشت دست (شستشو با آب و صابون و یا محلول های پایه الکلی) برای کارکنان بهداشتی و گیرندگان خدمت فراهم باشد.
 - 3- تهویه کافی و جریان هوا در فضاهای داخلی برقرار باشد.
 - 4- سطوح و وسایلی که بیشتر در معرض تماس هستند طبق پروتکل های مرکز سلامت محیط و کار ضدعفونی شوند.
 - 5- از پوست و بستر و بنر های آموزشی پیشگیری از COVID-19 در داخل مرکز استفاده شود (بهداشت دست، بهداشت در حین سرفه و عطسه، رعایت فاصله یک تا دو متر)
 - 6- تجمع افراد در داخل فضای بسته ساختمان به طرق ذیل به حداقل رسانده شود:
 - a. ارائه خدمات واکسیناسیون در همه روزهای کاری هفته
 - b. ارائه خدمات واکسیناسیون در همه ساعات کاری روزانه
 - c. نوبت دهی قبلی از طریق تماس تلفنی
 - d. حضور یک نفر همراه کودک برای واکسیناسیون و خودداری از حضور افراد بیشتر
 - e. در صورت امکان از فضای بیرون (حیاط یا محوطه بیرونی) برای انتظار استفاده شود.
 - 7- شستن دستها قبل و بعد از تماس با کودک و واکسیناسیون
 - 8- استفاده از ماسک طبق پروتکل صادره وزارت متبوع
 - 9- رعایت فاصله یک تا دو متر گیرنده خدمت در حین اقدامات قبل و بعد از واکسیناسیون مانند ورود داده ها در سامانه های الکترونیکی مانند سیب
- بر اساس اطلاعات موجود اگر فردی مشکوک و یا مبتلا به فرم خفیف بیماری COVID-19 باشد منع پزشکی برای واکسیناسیون محسوب نمی شود ولیکن برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، این افراد بایستی طبق پروتکل های مربوطه جداسازی و درمان شوند. لذا واکسیناسیون این افراد باید تا بهبود بیماری و 2 نوبت تست منفی COVID-19 به فاصله حداقل 24 ساعت و یا حداقل 14 روز بعد از رفع علائم بیماری به تعویق بیافتد.
- کودکانیکه در معرض تماس با افراد مبتلا به COVID-19 بوده اند منع پزشکی برای واکسیناسیون ندارند ولیکن باید جداسازی در منزل برای حداقل 14 روز انجام شود و سپس در صورت عدم بروز علائم بیماری، واکسیناسیون انجام شود.

در انتها یادآوری می شود ضمن فراهم نمودن شرایط بهداشتی برای تداوم ارائه خدمات واکسیناسیون در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت، از فرصت حضور خانواده ها برای آموزش راههای پیشگیری از COVID-19 و تشویق

شماره 304/906
تاریخ 1399/01/27
دارد

به فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در خانه، آموزش علایم بیماری و اقدامات لازم برای انجام در صورت بروز آن علائم استفاده شود.

دکتر محمد مهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

